

Gotas óticas Clorhexpro con lidocaína

Principio activo

Clorhexidina (digluconato al 20%) 2.5 %
Propionato de calcio 0.5 %
Lidocaína 2 %

Laboratorio

OSSPRET

Categoría

ANTIMICÓTICO , ANTIMICROBIANO , BACTERICIDA

Descripción

No debe aplicarse en animales con ruptura de la membrana timpánica.

Indicaciones

Indicadas en el tratamiento preventivo y curativo de otitis externa aguda y crónica, incluyendo aquellas que cursen con dolor, de origen bacteriano y/o micótico, levaduras (*Malassezia spp.*).
Agitar antes de usar.

Especies indicadas

Para ser usadas en caninos y felinos.

Dosificación y vías de administración:

Dosificación:

Según tamaño del animal:

menos de 5 kg de peso 2 gotas.

entre 5 y 10 kg de peso: 3 gotas.

entre 10 y 20 kg de peso: 4 gotas.

más de 20 kg de peso: 5 gotas.

Repetir cada 24 hs hasta mejoría de los síntomas.

Vías de administración:

Uso externo

Realizar un suave masaje en la base de la oreja.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No debe aplicarse en animales con ruptura de la membrana timpánica.

Presentación

Gotero 50 ml.

