INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas
La Libertad - Trujillo
(51) 932219044 / (51) 979232073
brivet@brivetperu.com
brivetperu.com

FICHA TÉCNICA


Pro-Cloxam

Principio activo

Cloxacilina (como cloxacilina sódica monohidrato) 200 mg
Ampicilina (como trihidrato) 80 mg

Laboratorio

PROAGRO



Categoria

ANTIBIOTICO

Descripción

Jeringa intramamaria para el tratamiento de mastitis aguda.

Indicaciones

Tratamiento de mastitis clínicas (mastitis aguda) de vacas en lactancia causadas por bacterias sensibles a Cloxacilina y Ampicilina.

Especies indicadas

Bovinos.

Dosificacion y vias de administracion:

Dosificación:

Un inyector en cada cuarto afectado cada 12 hs. Se recomienda un tratamiento de 3 inyectores intramamarios a intervalos de 12 hs. Pueden aplicarse tratamientos más prolongados cuando sea necesario a criterio del profesional veterinario.

Vías de administración:

Intramamaria.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

Vacas con antecedentes de alergia a antibióticos B lactámicos (penicilina G, Ampicilina, Amoxicilina y Cefalosporinas).

Presentación

Cajas con 300 jeringas.